




## Les espèces liées aux bois en exposition Nord

## Pic mar

lièrement répandu en France, l'établissement du Pic mar semble directement lié à la présence de vieux arbres, malades, ou à cavités comme l'on peut en trouver dans les vieilles forêts gérées



naturellement. Il fréquente les rameaux élevés des arbres à la recherche de proies qu'il glane çà et là. Il trouve d'ailleurs la majeure partie de sa nourriture à la surface des branches et serait nettement moins excavateur que son congénère le Pic épeiche avec lequel il cohabite ici. A l'instar des autres Pic, il creuse son nid dans des troncs. La ponte a généralement lieu en mai et les deux parents nourrissent les petits. Une fois l'élevage des jeunes terminé, les loges de pics sont généralement abandonnées...elles seront ensuite utilisées par de nombreuses autres espèces, comme les Mésanges, la Sitelle torchepot ou des chauves-souris arboricoles.

## La Salamandre

La Salamandre affectionne les zones boisées et fraîches. Essentiellement nocturne, elle est plutôt casanière et son territoire de vie est assez restreint. La journée, elle se cache dans les souches, sous la mousse, ou dans les tas de branchages. Seule la ponte a lieu dans l'eau. Contrairement aux grenouilles, qui pondent des œufs, la Salamandre donne directement naissance à des larves. Sa vie cachée et nocturne lui a valu une réputation démoniaque : autrefois, quand les bûcherons brûlaient des tas de branches en forêt, ils voyaient des salamandres en sortir et pensaient alors qu'elles naissaient des flammes! Au Moyen-Age on pensait aussi qu'elles empoisonnaient les ruisseaux, mais la salamandre n'est toxique que pour les petits prédateurs.

